

Où se faire vacciner ?

Chez le médecin traitant, chez le pédiatre, dans les centres de vaccination, au collège par les équipes de vaccination.

Le calendrier vaccinal, c'est quoi ?



Le calendrier vaccinal définit chaque année les **vaccinations recommandées** en fonction de l'âge. On y trouve pour chaque vaccin :

- le nombre d'injection(s) à faire
- l'âge auquel il faut les faire.

Il est établi par des experts de la vaccination au regard des données scientifiques. Le calendrier des vaccinations **2013** introduit des modifications importantes pour l'ensemble de la population : moins d'injections du DTP pour tout le monde et des rendez-vous à âges fixes pour les adultes.

Un protocole de vaccination, c'est quoi ?

Quand il n'est pas possible d'avoir une bonne protection avec une seule injection, il est alors nécessaire d'espacer plusieurs injections et de faire des rappels pour obtenir une protection efficace et qui s'inscrit dans le temps.

Un protocole complet est la garantie d'une bonne protection.

Que fait-on si les vaccins ne sont pas à jour ?

Il n'est jamais trop tard pour faire ses rappels.

Il arrive d'oublier de faire ses rappels ; pas de panique ! Généralement il suffit de reprendre le protocole où il a été interrompu sans tout refaire.



Vous avez des questions sur la vaccination...

Vous pouvez en parler avec votre médecin, à votre pédiatre, à votre pharmacien, à votre infirmier, aux médecins et infirmières de PMI, au médecin du centre de vaccination, au médecin ou à l'infirmier de l'établissement scolaire.

Pour toutes informations complémentaires, consultez les sites suivants :
www.mesvaccins.net ou **www.ars.haute-normandie.sante.fr**
rubrique > Votre santé > Les dossiers de A à Z > Vaccination

Vaccination où en êtes-vous ?





Vaccination DTP

Le vaccin DTP est réalisé chez le nouveau né en même temps que d'autres vaccins. Des rappels doivent être réalisés régulièrement à 11 mois, 6 ans, 11 ans, 25 ans, 45 ans, 65 ans puis tous les 10 ans à partir de 65 ans.

Vaccination coqueluche

Ce vaccin est réalisé en même temps que le vaccin DTP. Un rappel est nécessaire à 11 mois, 6 ans, 11 ans, 25 ans.

Le nourrisson est susceptible d'être contaminé par son entourage (parents, frères, sœurs et grands parents). En attendant la protection de ses vaccinations, tous les adultes en contact avec lui doivent être vaccinés contre la coqueluche.



Vaccination rougeole, oreillons, rubéole

Les personnes nées à partir de 1980 doivent avoir reçu au total deux doses de vaccin. Actuellement, avant 18 mois les enfants doivent avoir reçu deux doses.



Vaccination HPV

La prévention du cancer du col de l'utérus se réalise en faisant deux doses de vaccin à partir de 11 ans. Celles qui ont débuté la vaccination à partir de 14 ans doivent recevoir trois doses.



Vaccination méningocoque C

La protection contre les infections invasives à méningocoques (méningite C) se réalise en une seule dose dès 12 mois. Si ce vaccin n'a pas été réalisé, un rattrapage est possible jusqu'à 24 ans.



Vaccination hépatite B

Le vaccin contre l'hépatite peut être réalisé chez le nouveau né en même temps que d'autres vaccins (3 injections). Si les trois doses n'ont pas été réalisées, un rattrapage est possible.



Vaccination contre la grippe saisonnière

La vaccination contre la grippe est recommandée pour toutes les personnes à risque (personnes de plus de 65 ans, personnes en longue maladie, femmes enceintes ...). La vaccination est conseillée pour toutes les personnes en contact avec les personnes à risque. Il est nécessaire de réaliser une dose chaque année.



Vaccination pneumocoque

Le vaccin contre le pneumocoque est réalisé chez le nouveau né en même temps que d'autres vaccins. Certaines personnes à risque peuvent bénéficier de cette vaccination.

Faites vérifier votre carnet de vaccination auprès

- de votre médecin traitant,
- de votre pharmacien,
- de votre infirmière libérale,
- d'un centre de vaccination ou d'une PMI,
- d'une infirmière de collège ou de lycée.

Nom et prénom : Âge :

Vaccins		 <i>Précisez les délais dans lesquels la vaccination est à mettre à jour selon les recommandations vaccinales en vigueur</i>
Diphtérie, tétanos, polio		
Coqueluche		
Rougeole, oreillons, rubéole		
Papillomavirus (HPV)		
Méningocoque C		
Hépatite B		
Grippe		
Pneumocoque		
Autres :		



Vaccination à jour



Vaccination non à jour